



DATOS DEL PRODUCTO

Nombre Comercial : Superinduminas
Nombre Genérico : Zeolita
Fórmula : $X(YO_2)_n \cdot mH_2O$
 Con **X**: Na, Ca, Ba, Sr, K, Mg, Li
Y: Si, Al
Registro Sanitario No. : SCI-R003998

CARGA MINERAL

Nutriente	Concentración
Silicio (SiO ₂)	: 51.71%
Nitrógeno (N)	: <0.01%
Fósforo (P ₂ O ₅)	: 0.01%
Potasio (K ₂ O)	: 0.12%
Calcio (CaO)	: 15.20%
Magnesio (MgO)	: 0.49%
Azufre (S)	: <0.02%
Sodio (Na)	: 0.10%
Cloruro (Cl)	: <0.02%
Hierro (Fe)	: 1.86%
Manganeso (Mn)	: 0.01%
Cobre (Cu)	: <0.01%
Zinc (Zn)	: 0.01%
Boro (B)	: 0.01%

DESCRIPCIÓN

Mineral de origen sedimentario, muy utilizado en la acuicultura pues mejora la calidad del agua gracias a su composición rica en una amplia gama de minerales que le permite estabilizar su pH, actuar como promotor del crecimiento y atrapar toxinas al utilizarlo en el concentrado de los alimentos.

MECANISMO DE ACCIÓN

Superinduminas atrapa toxinas y fomenta la proliferación del fitoplancton que sirve de alimento para las larvas del camarón.

PRESENTACIÓN



Sacos de polipropileno laminado con marca Superinduminas de 30 kg.

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Granulometría	: Malla 40 A.S.T.M.
Aspecto	: Polvo fino
Color	: Habano
pH	: 7.8
Densidad Aparente a 20°C	: 1.05 g/ml
Conductividad Eléctrica	: 0.10 mS/cm
Solubilidad en Agua a 20°C	: Insoluble al 0.01%
C.I.C.	: 11.32 meq/100g
Humedad	: 11.96%

INCOMPATIBILIDADES CON OTROS PRODUCTOS

- Ácidos fuertes
- Aluminio

En caso de dudas, se sugiere realizar ligeras pruebas de compatibilidad o contactar con el departamento técnico de nuestra empresa.

APLICACIÓN

En polvo, tal como viene en el envase.



BENEFICIOS

- Disminuye los olores desagradables generados por gases y materias en descomposición.
- Incrementa la tasa de conversión y da muy buenos resultados en la salud general de los animales.
- Logra acortar los ciclos de cosecha.
- Mejora la salud de los peces y camarones.
- Estabiliza el pH del agua del estanque.
- Mejora la calidad del agua y el piso del estanque.
- Usada como un portador de vitaminas, minerales, antibióticos y otros suplementos activos en la alimentación animal.

DOSIFICACIÓN

USOS Y MODO DE APLICACIÓN	DOSIS	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
En el estanque (con el 30% del nivel de agua)	3 - 4 sacos de 30 kg/ha	cada 15 días
En seco (en el fondo del estanque)	4 - 5 sacos de 30 kg/ha	cada 15 días
Aditivo alimenticio	10 - 30 g / 1 kg de balanceado	